庫全書

子部

欽定四庫全書 雖治準經卷二十九

子部

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官大醫院吏目員問世泰

腾銀監生臣許 溶校對官中書臣宋杉遠顧校官進士臣朱 鈴 題校官進士臣朱 腾銀監生臣許

とこり屋 といま 附湯 治中濕脈細自汗體重力枝湯 治傷寒脈浮自汗惡寒方 整治率絕 痛見濕見 王肯堂 撰

防己黄芪湯見身當歸六黄湯 耆 黄耆建中湯 附湯 每服五錢水一鐘半薑五片棗二枚煎八分去沒 右㕮咀每服四錢水一盏生薑十片煎八分食前温 稠 黄耆去産 黄耆 66一大匙再煎服舊有做連或區者不用傷 治氣虛陽 桂 附子站去 治氣血不足體常自汗 我十白芍 藥 五甘草 鸦 虚汗不止肢體 分皮 臍 汗見 倦怠

多附湯 黄耆六一湯 ここコラ 時常焦渴唇口乾燥面色麥黃不能飲食常服平補 **乳血安和藏腑** 右分作三服薑水煎 服未應更加之 黄者左西文甘草一 2, 11 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈 附子蛇去皮 治男婦諸虚不足肢體勢像胸中煩悸 **张治华**繩 ı₫g

倒分四 玉屏風散 周 衛湯東治濕勝自汗補衛氣虚弱表虚不任外寒 加白术白芍藥 每服五錢水一盏囊一枚煎七分不拘時温服一 每服三錢水二盏薑三片煎六分不拘時温服 黄耆 防風 四百 劾得 麻黄根 黄耆 两各 火 銭各 指苓 白木二 生甘草 羌活各七麥門冬出生 當歸 梢 生黄芩

欠足四車 全島 羌活勝濕湯 右攻咀如麻豆大作一服水二盏煎至一盏去查稍 根節也 热服中風證必自汗汗多不得重發故禁麻黃而用 甘草 分獨活分升麻 地黄路三五味于如蘇木 参三獎玛胸中熟 黄耆女生甘草五生黄芩 推治準繩 杂胡及無縣其濕細辛 川号 紅花分 禁本 酒黄芩 防風

七氣湯見 理氣降痰湯 水二鍾煎八分食遠服 右作一服水二蓋煎一盖半後入細辛等四味再煎 至一盏熱服 桔梗 没 貝 海荷! 母 积殼炒橘 幾桂枝 清 利分 頭已 紅 目上 甘草分 半夏麴以茯苓皮香附 <u>5</u>. 便童

建中湯 凉 くこりを とら 膈散 右作 當 服本方加黄茂二錢名黄茂建中湯治虚勢自汗 服 止者加桂一 歸名當歸建中湯治婦人血虚自汗其自汗漏 芍藥或官桂 热見 服水二鍾生薑五片東二枚煎至 治表虚自汗 簽 錢 熟附子半個名桂枝附子湯煎空心 甘草泉各 整 二 平 經 鍾食 前 力口

白木散唯治虚風多汗食則汗出如洗少氣痿劣又不 安胃湯水治因飲食汗出日外心虚風邪來入令人半 治必為消渴證 右為末每服一錢温水調下不拘時候如惡風倍防 牧之 身不遂見偏風癢痺之病先除其汗懷悍之氣按而 風白术如多汗面腫倍壮蠣 媽城三白术丹雨二防風一 輌

正元散 尺色口声 白色 下冷利少氣羸困一切虚寒 自汗陽氣甚微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久 類 水二盏煎一盏食遠温服尼濕麵酒五年大料物之 紅豆以乾薑地陳皮去白各人奏 黄連姓五味子 升麻梢 治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐 烏梅肉 極治平輝 生甘草分五熟甘草 白术

多グロイ 扗 珍散 飲食 煎七分食前温服常服助陽消陰正元氣温脾胃進 媽散 三治諸虚不足及新病暴虚津液不固體常自 右為細末每服三錢水一蓋薑三片棗一枚鹽少許 免茯苓士成各为桂去 第川馬也去 亦治盗汗不止 山藥道汁川芳 馬樂士乾葛春一黄耆矣 兩皮 附子

茸 しこ可見 大補黄茂湯我 拘時服 硃丹鬼頭黑錫丹斯出 靈砂丹鬼 朱砂丹 右對散每服三錢水一盏半小麥一百粒煎八分不 黄芪 黄茂多防風 方上三味各一兩白术半兩甘草二錢半 1.1 1.10 麻黄根 Ą 良甘草 五味子 人参和一白茯苓 山茱萸肉 強治準繩 牡蠣城研各得効方有知母又 當歸 白术的肉桂 削

劉方四四日言 實表散察治感冒腠理不蜜自 黄者湯其治喜怒驚恐房室虚勞致陰陽偏虚或發厥 炒浮小麥煎不三四服安 右㕮咀以黄茂建中湯相停和合匀依本方薑棗加 服 每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時温 附子此肉從蓉酒細辛 兩熟地黄二肉從答酒沒 五味子 汗 兩各

人三日車 白蜡 撫考湯察治自汗頭眩痰逆惡心 加熟附子發熱自汗加石斛未効或多喫麵食則安 右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發厥自 自汗或盗汗不止 撫芳 門冬出麻黄根 黄耆 盖當歸去 选甘草 具各 炙一两半白茯苓去熟地黄酒肉桂不見去産塞水白茯苓去熟地黄酒肉桂不見 白木器炒 4 龍骨兩各 極治學調 橘紅西一甘草或平 五味子 小麥炒防 <u>x</u> 汗

昼りでか بار 止汗紅粉 止自汗方 汗温粉 右為末每用綿包裹撲於身上 右判散每服四錢生薑七片煎温服 麻黄根 川号 用 ノニート 川鬱金研細末臨卧以唾津 白芷 牡 媽 蒙本西 ₩赤石脂 基二十九 米粉 龍骨 調敷乳上 兩三

人已四年 全島 止 力口 汗粉 右為末和攪令可以生網袋或用粉身體日三兩度 腦子故陽粉 灸亦得汗即漸止 忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷灸二七五七任心 右為末以網袋盛貯如撲粉用之 麻黄根 米粉井 牡蠣粉 治 切虛汗盜汗自汗及漏風等盤 经六草鄉 敗扇灰 瓜姜三两白木

多分に入るす 黄耆湯 右為細末研与以魦帛包裹於汗處撲敷之汗止為 汗泄不禁服諸樂不能止者 右為細末每版三錢用大麻仁一合爛研以水投取 度 粉一點子我 鄉黄耆 麻黄根 豪本 白芷 陳皮士白各 牡蠣 龍骨 上山 各

人二日年 公司 三构湯 當歸六黃湯 秘澀甚者两服愈 製一 蓋濾去滓於銀石器內煎 候有乳起即入白蜜 人夫再煎合沸調樂末空心服治高年老人大便 當歸 **牧見** 咳 盆汗 生地黄 熟地黄 陸治單罐 黄蘗 黄芩 黄連

正氣湯 白木散 防風散 對京四府 石書 右作 右為細末每服二錢臨即米飲調下 右為粗末作一服水二盖煎一盖卧時黄藥炒一知母炒一甘草水五 防風五川等一兵人参小矣二 服水二種煎至一種臨 卧 服 服

麥煎散 **尺已习事在島** 右用水煮乾如水的硬又加水一二升煮軟取出去 面黄肌瘦並皆治之 另用浮麥煎湯調 麥不用切作片焙乾研為細末每服二三錢不拘時 白术小地或稍大浮麥 烟人麥 茯苓 乾葛 川烏也去元麥各胡苗秦光各二鼈甲二兩醋者三五十沸克 治帶衛不調夜多盗汗四肢煩疼飲食進退 服 撥治學絕 漆

大建中湯 漸贏弱口苦古澀心怔 附子二錢腰痛筋急加官桂去皮一錢 右 麥入樂再煎三五沸食後服 右為細未每服二錢先用小麥三七粒煎湯一盡去 作一 綿黄芪灸遠志姓 龍骨城人参我十足甘草 服水二鐘薑五片煎一鐘食前服氣弱 治虚熟盗汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日 v 心心煮 短 當歸海澤寫各二白芍藥 氣 カロ 炮

大巴马车上 叉方 四白散 行 蓋去滓食前温服 右對碎每服三錢水二盏生薑三片東一枚煎至 白术 蔻 陳皮爾一白茯苓 治盆汗夜卧床蓆衣被盡濕 甘草和平芍藥一兩檀香 治男婦血虚發熟夜多盜汗羸瘦脚痛不能 白扁豆 藿香 推治草褐 人參 半夏 益智 沉香各半二 厚朴 烏藥 黄芪 白丘

青蒿散 腥臭困倦少力肌體 懈 行八九里外中任食一日令盡忌辞熟麵等物 右切以水六升者取二升五合去浑分温六服如 枸杞子用 麻黄根 情骨節疼痛心腹驚悸咽燥唇焦頰亦煩躁涕唾 41 仏藤 治虚勞盗汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾枯四肢 鼈甲酷香附子炒去枯 牡 四白 蠣 兩皮 大東少枚 各三两黄花 潮熱飲食減少日漸瘦 人参兩二龍骨 梗 蘆去 杂 胡 弱 秦

補中益氣湯 J. 17 & Lista 弦 子但升麻柴胡俱用蜜水炒尺脈虚大者加炒黄韓 火炎上者加五味子麥門冬黃連各一如左關脈浮 肌瘦減食者每一錢水蓋半小麥三十粒煎服 右對散每服薑三片煎不拘時温服小兒骨蒸勞熱 證自汗不休者加麻黄根浮小麥陽虚甚者加 自汗挟風邪也加桂枝五白芍樂一如一切虚 青萬各 治内傷氣虚自汗为見内如脈洪大心 烏樂冊良甘草一 施上草屋 川考二两 附 損

茯苓湯 白术湯 彭庆四月白書 右用白术町中 知母熟地黄 右用白茯苓為末每服二錢煎爲梅陳艾湯調下 劾 治虚汗盗汗 去雨分 未每服三錢栗米煎湯送下盡四雨為 同作 牡四 城處一兩 雨月 同黄 姓氏 ·皮炒 炒一 各兩 味同 以石 炒料

椒 栢子仁九事戢陽氣止盗汗進飲食退經絡熱 て...) Ti.on たよう 囙 服得效减一服得愈即住作散亦可 右為末東向光桐子大空心米飲下三五十九日二 散 柘子仁 椒 μĒŋ 目 治盗汗日人不止 麻黄根慢火灵白术 麻黄根等 半夏麴各二牡蠣甘鍋子內 羅治學與 主 焙 火 乾蝦 用

國方四年全書 酸素湯井治虚勞虚煩不得眠 當歸龍舊九見船牡蠣散見 治盗汗外腎濕 未之煉蜜丸桐子大每服三十九境輕湯下 為細木每服一錢無灰熟酒食後調 人参 酸東仁二甘草一知母 不 得卧 苦參 龍膽草 È 茯苓 麻黄根各三 服

シンコル たた 鼈甲九本治膽虚不得眠四肢無力 酒送下 右為細末煉蜜杵為丸如桐子大每服三四十九温 计分温三服 右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸樂煮取三 五味子分等 鼈甲 酸栗仁 ্ৰ 羌活 遊治華羅 牛膝 黄芪

国方四月 台書 平胃散見中六君子湯見座 羌活勝濕湯 湯見導痰湯見乘真珠母九 温 , 参補氣湯 膽湯鬼六一散見傷六君子湯見止青靈丹歌益荣 黄茂童残人参 分白芍藥 怠惰嗜卧 治四肢懶倦 治 卧而多鸞邪在少陽厥陰也方 生地黄谷五熟地黄分生甘草 防風 獨活湯與 升麻 見 知母七年 痛見

大旦日本人 升陽益胃湯 惡寒 惡寒慘惨不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也为 大便不調小便頻數不增食食不消無見肺病灑淅 秋燥令行濕熟少退體重節痛口苦舌乾飲食無味 右為粗末水二蓋煎至一蓋去滓空心熱服 甘草以五味子二十肉桂小 身重 治脾胃虚乏怠情嗜卧四肢不收時值 极治学蝇

芍藥湯则 甘 防己黄者湯料治身重汗出惡風 多けにる 補中益氣湯見劳五苓散見消小柴胡湯見往 薑苓木湯中 右剉每服五錢七生薑四片東一枚水一盆半煎至 八分去滓温服良人再服腹痛加芍藥 甘草 防己一黄耆一两二白木七战甘草成半 1 專 白术為二乾薑 茯苓香四 來黄芪

多术湯東 正等二陳湯此張人參半夏九見官 與見一陳湯北張人參半夏九見官平胃散見中黄茂建中湯月自四君子湯 水二蓋煎至一蓋帶熱服食前 水五升煮取三升分温二服腰中自温 黄耆二人多 陳皮 青皮谷五升麻 酒黄葉分三神趙七當歸八管术或甘草矣四 不能食 六君子湯 夫 柴 胡

又和中九 治久病康厭不能食而藏府或秘或結或 和中九班開胃進食 腸胃進飲食 海此皆胃虚之所致也常服和中理氣消痰去濕厚 右為末蒸餅為九食前白湯下三五十九 乾薑一甘草及陳皮各一木瓜七人参 白术各 白术二两厚朴盖製陳皮去白一半夏湯池檳榔

J. Jonat Lista 七珍散事開胃養氣温脾進食 右八味為末生薑自然汁浸蒸餅和九如梧子大母 右為細未每服三錢薑囊煎服如故不思飲食加扁 加扁豆砂仁桔梗五味子 服三十九温水送下食遠服 甘草分等 我把實及甘草 成四木香 白术 黄茂宝山藥 白茯苓 栗米做 班 治 草 發 續易簡十珍散即此 さ

副京四届 全書 錢氏異功散 神湯海治傷寒虛贏不思飲食 豆 右為未每服五錢薑囊同粳米合許煎食前服 草 残 兩名八珍散 白术 白茯苓 治脾胃虚弱難任飲食 黄茂和一枳殼 白术 甘草 橘紅 白茯苓和牛 木香

هلغ ليكر سلحط 10 لد، ك 寬中進食九 誤重 右為末湯沒蒸餅為九母服三五十九白湯下按 右蓝柔水煎服 和 打實四 我 草豆蔻仁或半夏翅北大麥芽麵炒 我 三 乾 蓝 甘草及各一陳皮三木香五白木 滋形氣喜飲食 指答去黑澤寫 **塔治**草 人参 青皮 白茯

多分正月 啟 二神九事治脾胃虚弱全不進食及泄寫不木香积木九 木香乾薑枳木九俱見 胛 味儿 取囊剥去皮核肉研為膏入樂末和杵丸如梧子大 每 右為末用肥棗四十 服三四十 九鹽湯下 九成治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹 破 故紙馬炒 とうき 勞見 虚 木香氧藍积木 四內直卷五二 九生薑四兩 **と刀** 片 同 止 煮 燗 去 膨 脹 薑

大正四軍 白島 煮朴九即厚朴煎九百温中下氣理脾進食常云補腎 不如補脾胃壯則飲食進而精血白威矣 右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸食前細嚼用 腸鳴泄瀉不思飲食 米飲送下 粉縮砂仁 白术 乾薑地厚朴士氣皮出生 甘草 青皮為洗陳皮為先神麴以麥藥 经治华战

理中九 多がたけった 飲下 右為細末生薑煮栗肉為凡梧子大每服五十九米 同乾薑二味再用水五升同前厚朴煮水盡去甘草 只用薑朴二味焙乾 二味用水五升同煮乾去薑以厚朴焙乾 船上尚香 油厚朴一斤生薑一斤不 乾薑各四附子 她二甘草二两 去 長剉

大是四軍全書 鹿茸橘皮煎九和治脾胃俱虚不進飲食肌體瘦悴四 肢之力常服壯脾胃益腎 右為細末用酒五升於銀石器 荆三稜 提當歸 焙 焙酒 酒去 杜 沒應茸 浸 仲 附子也巴戟去防起石 শ্ 去線 乾薑丸各甘草 劈茄 開 子 酒者 革解 路治聲機 浸泉 免絲子海具茶英海 厚朴製肉桂 如粉石 内 籽 干成一福皮去, 檑 皮煎熬如锅 在解去牛 肉從塔

失定九鬼 丁香者散 治翻胃嘔进三十九空心温酒鹽湯任下 丁香煮散 附方 却入諸樂末在內攬和 水一稅半煮稀粥去藥吸粥 揭五百杵九 如梧子大每服 黄林米

飲定四庫 全書 育氣湯 參术調中湯 至一酸去滓温服食前 右十二味到如麻豆大每服一雨水二般薑三片煎 橘皮各三 豆蔻 **嘔嗜卧懶言足胻冷頭目昏** 通流百脈調暢脾元補中脫益氣海祛陰寒 木香 黄者各五當歸身 厚朴製益智仁 治内傷自利劑腹痛肢體倦不喜食食 白术 · 温光 字 純 甘草及神麴炒麥縣麪 主 草

凝 神散 右為未每服一錢至二錢用木瓜湯調下空心食前一陳橘皮去青皮去白各加白檀香中 鹽湯亦得 止腹痛進飲食大益臟虚疼痛 縮砂 木香 丁香 藿香 人参 人参 白术 茯苓 山藥各一白扁豆 收飲胃氣清凉肌表 白荳蔻 華澄船 炙甘草各半乾山藥 白术 白茯苓 知

火之四年 白馬 加口 減思食丸 時脹連年累月食減嗜卧口苦無味虛贏少氣又治 虚不勝穀氣或因病氣泉食不復常並宜服之 胸中有寒飲食不下反胃惡心霍亂嘔吐及病後心 腶 右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎至一鍾食達 治脾胃俱虚水穀不化胸膈痞悶腹脇 粳米 路治华延 甘草矣一淡竹葉 主 地骨皮

扣 医牙口压 分章 胃 右為細末煉蜜為九如櫻桃大母服一九不拘女揀甘草細到炒各 無木瓜茯苓有人參乾薑各三銭 嚼白湯送下如渴時喻化一先生津液進飲食一方 厚 楩 凡 朴 題此麥葉炒 **汁去** 炙篾 治脾胃虚冷食即嘔逆水穀不化或時 透皮 四两草藍鬼當師 烏梅四 消陳皮 乾 **木**瓜奶" 白湯兩焙 檳 半 白术 白茯苓 榔 時 泄 剉 桔 知

人足习事 公与 生胃丹 右為細末酒煮糊丸如桐子大每服十五九渐加至 二十九温生薑棗湯下米飲亦得不拘時 後藥研丁香不見木香水見再十數以知時就同丁香不見木香不見厚朴去皮薑大南星四兩用黄土半斤野生薑汁拌黄土 兩甘草成 訶梨勒皮上錢 麥葉少縮砂仁 沉香不見甘草泉各栗米一井 白豆蔻仁 青皮士白各 南土星成

養胃進食丸 消瘦怠惰嗜卧全不思食常服滋養脾胃進美飲食 泐 消痰逐飲辟風寒濕冷邪 右為細末法九如裝豆大每服七十九不拘時淡 着术五两 下 浸搗 族目 焙糕 T. 皮油 治 神勉二两白茯苓去皮厚朴 胛 胃虚弱心腹脹滿面色麥黄肌肉 氣 薑

資生九 傅例者服之即飽飽者食之即例因疏其方余大善 初識緣仲淳時見袖中出彈九咀嚼問之曰此得之秘 之而頗不信其消食之功已於醉飽後頃服二九徑 十九食前温薑湯送下粥飲亦得 右九味為末水麵糊丸如桐子大每服三十九至五 依即風與了無停滯始信此方之神也先恭簡 脾弱食少疾多餘齡葆攝全粉此方因特附若于 健脾開胃消食止瀉調和藏府滋養禁衛余 No. 登七 專 繼 ŧ

與世共之 术 白 瀉 山 雨上晒米 服雨肉雨心妙油川 蒸水乾拌 一五约 各真 黄晒脆三点

V.10.2 /11 健脾九 冲和九 養心扶脚疎肝 午各一次陳米湯下 右為細未蒸餅為九如菜豆大每服五十九空心下 爵淡薑湯下 查取山藥 白术白者二木香研黄連酒甘草各七白茯苓 人參一两神勉炒陳皮 治一應脾胃不和飲食勞倦 肉豆蔻枝裹煨熟紙色提 维治学题 開胃 砂 仁 圭

多分四母 在書 膈間之滞氣也 右各取淨末如上法蒸過勿令洩氣此透暢心胞達遠志甘草湯池香附達便沒半日上梔仁炒無各 調胃補心接丹田之氣也 右各取淨末和勻碗或碟益飯上蒸過候冷方開此 海石 石斛 白豆卷仁 廣陳皮各一 山查肉

KIND THE KIND 相魚服 辰砂五錢為衣食後少項白湯下五十九胃開氣順 母 如上法蒸此踝肝鬱伐肝邪者也 夫心為脾母補 少覺舒泰則減數服之可與補中益氣湯六君子湯 如上法蒸此消痰飲通内外之用也 則子旺肝為脾賊平賊則脾安安殼則昌用穀藥 粉打糊為九如梧子大晒乾用益元散五錢雅過 考二七柴胡 青黛两各 掩 治準羅 丢

訶子湯 又方 多分四年 白書 右 每服一錢七入沙糖一小塊不 桔梗三大訶子四甘草二两 服甚者不過三服愈 為 訶 細末每服二錢童便一盡水一盛煎五七子四個中桔梗一兩半甘草二十半 問河 治失音不能言語 卷二 肺粘 尊梗 氣通 童利 用童便 同製 便肺 降氣 火訶 擉 甚子 用水五盏 速泄 沸 温

大足四員 在島 發聲散減治咽喉語聲不出 玉粉九蟹治冬月寒痰結咽喉不利語聲不出 右為末生薑汁浸蒸餅為丸如芡實大母服一丸至 綿裹噙化縣津亦得日兩三服 右為細末每服三錢温酒或薑自然汁調下用五分 放至三盏時時細呷 半夏洗五草鳥 枯蔓皮對白殭監去甘草各好黄 英桂 **数治學**編 日服盡其効甚速 Ī

多いという とうす 治暴嗽音語不出方 蛤蚧九丹治肺間邪氣胸中積血作痛失音并治久欽 失音 夜含化 右為未煉蜜九如棗大母服一九食後含化 杏仁皮研 生地黄 蛤蚧一對去嘴足温 去薑汁 麥門冬出北細辛 金十 基 沙 二十九 火水 糖 醋浸 白蜜各一五味子 炙去 膜 苗甘草 訶子核煨 去阿 兩各 膠

通聲膏方 J. 19 ... /. 1. 升去浑入杏仁泥薑汁白蜜和勻微火煎取四升初 服四合日再夜一後稍加 右以水九升煮五味子索花通草貝母桑白皮取三 花西三通草 五味子 数冬花 通草的三人参 萬十五一酥五 青竹皮 菖蒲本二杏仁泥十白蜜二東膏 貝母和四桑白皮五 細辛 桂

七珍散 盤炭四庫 全書 珍湯見在秦光升麻湯見中柴胡清肝湯見耳小 地黄飲子見中加味逍遥散見為加味歸牌湯見 右以水五升微火煎三上三下去查納道汁東膏酥 **蜜煎令調和酒服如東二大九** 右為細末每服一錢薄荷湯下 風 展 砂 男 治産後不語 石菖蒲 初研 各 生地黄 川芳春 細辛 、杂胡 防

大見日本主 野氣九即八味九 易虚 五苓散盛治小便不利而渴 右五味為末以白飲和服方寸七日三服多飲暖水 熟 未六君子湯 猪苓去皮七澤寫一兩二茯苓七及桂去皮白木 消瘅 發治草絕 四君子湯與男佛手散即考歸 ŧ

白 文 猪 用 文蛤雨 先者四味 滑小 水 不 止 味取二升去海内膠媽消 清石 澤寫為一 便 不 利

大心可能在 加減地骨皮散或治上消 人参石膏湯母治膈消上焦頭渴不欲多食 右為細末每服三錢薑五片水煎食遠温服 每服五錢水煎食後温服 杵為散以沸湯五合和 服方寸七 知母 人参或石膏一知母或甘草四 白芍藥 柴胡 黄耆 甘草灵半夏 极治环鸠 石膏 黄芩 地骨皮 桔梗谷等 Ē 赤茯苓

一年に入 江 一日 八丁一日 竹葉黄芪湯 竹葉石膏湯件 成去米温服一升日三服 右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯 淡竹葉 川芳 参画甘草二 石膏一竹葉上半夏半斤粳米井麥門冬去心 黄芩炒甘草 治氣血虚胃火盛而作 生地黄路二黄茂 Ā) 答二十 九 芍藥 人参 麥門冬 渴 半夏 當歸 石

錢氏白木散 しこうし 宣明黄芪汤 肺平心 右水煎服 右為未每服五銭水二盏煎至一盏去滓温服無時 **青** 一版 枸杞子 黄茂馬五味子 Ţ 熟地黄西半 治虚熱而渴 治心移寒於肺為肺消飲少溲多當補 人參 聖治草罐 麥門冬 天門冬山 圭

宣明麥門冬飲子 到京四届全書 精神短少 右為末母服三錢煎温服如飲水多多與服之海藏 **乳脱泄利太** 甘草 人参 柯 乾葛二 茯神 白术 知母 啊 追濕 葛根 麥門冬 治心移熱於肺傳為膈消胸心煩 白茯苓 卷二十九 括姜根各等 五味子 藿香土木香 生地黄 甘草 炙

白虎湯 易老門冬飲子 ノこりを たち 霍見 亂夢 聍 右攻阻每服五錢加竹葉十四片煎至七分温服無 右鹽水煎服 五味子士心各 凉 枸杞子 胸散五見小崇胡湯見 治老弱虚人大渴 白茯苓 甘草各七麥門冬去 经治學機 熟往 米四君子理中 主

多次四 加減三黄丸科治丹石毒及熟渴以意測度領大實者 止渴潤燥湯 右為末煉蜜九如梧子大母服十九服一月病愈春四雨 鬼之雨 冬三兩大黄秋二兩 冬四雨黄 方用 上白條辱裂口乾眼澀難開 升麻一或柴胡以甘草稍如杏仁六個桃仁研麻 治消渴大便氧燥喜温飲陰頭短縮舌 及於黑處如見浮雲 冬四兩黃連

大之日華全 調 猪肚丸三治强中消渴 胃水氣湯見 右為 右水煎去滓食後熱服 黄連 錢各 研當歸身 細末將大猪肚 熟地黄馬小椒 栗米 發大承氣湯 私 防風根 枯姜根 数冶琴绳 個洗淨入藥末於內以麻線 組辛分 茯神 和四四 荆芥穗 通中夏寫心湯見 紅花 黄葉酒石膏 知 母 79

化便见酒 数量砂丹 生 經合口 置甑中 小麥 湯下又方加人參熟地黄乾葛又方除知 入煉蜜搜和前藥杵匀九如梧子大每 丹常治手足少陰渴飲不止或心痛者本事靈砂丹見临 妈黄者飲即黄茂六一湯 見自立死丹 炊 極爛取出藥別四 研 ょく 猪 服五十九多 母粟米用 肚為膏 纹

1000 m 1.15 神 右為細末每服一錢新汲水調下 仙減水法名斬龍割子手 能化停水 日夜飲水無度此樂主之 痛者醋湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云此藥 右為細末醋浸蒸餅為凡每服十五九新汲水下心 浮萍 天花粉 3 白扁豆 班治华艇 知母 黄茂和一黄丹 宣黃連 治三焦虚熱三消渴 苦麥 許少 19

一多方四母 有量 生津甘露飲子 告麻古根强硬腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色 **黄目白睛黄甚則四肢痿弱無力面塵脱色脇下急** 痛善嚏善怒健忘鹘肉腰背疼寒兩九冷甚 邁黄! 芷 石膏二残中一方桔梗三人参 甘草及升麻 柴胡分二藿香分白葵花 連 一线山拖仁 翹 甘草生華澄茄 治消渴膈消大渴飲水無度上下齒 錢知母酒洗各白豆蔻 **线各** 麥門冬 黄連 當歸身 木香 白

いくこの単んは 大府丹見 和血益氣湯 乾燥長肌肉 右為末湯洗蒸餅和匀成劑捏作餅子晒乾杵碎如 亦不傅瘡鴉下消矣 白湯少許送亦得 黄米大每服二錢抄在掌內以舌舐之隨津嚥下或 蘭香各五黃葉的杏仁士及各全蝎 7 治口舌乾小便數舌上赤脈生津液除 股治草蝇 此治制之緩也不惟不成中滿 圭

黄連膏 国际正居 台書 水三鐘煎至一鍾半分二服無時 黄連一升張 草 錢各 生 开 八酒 八分紅花分桃仁士皮火炒麻黄為一石膏一 我黄連酒液一杏仁士生地黄酒黄蜂液升麻各二防已酒 炙生 治證同 六五 分分 牛乳汁 前 白蓮鶇汁 +去浸酒 柴胡 一皮 知 生地黄汁 枚尖 母 炒浸酒 分各 古世 當歸 羌 活

連若飲料 生地黃膏 金散四治熱中多因外傷燥熱內用意傷脾飲暖肥 右先将地黄洗搗爛以新汲水調開同審煎至一半生地黄 及冬家此人参西白茯苓去皮 少叫湯下日進十服 右將汁熬膏搓黄連末為此如小豆大每服二十九 入参答未拌和以磁器塞收匙挑服 罗/ 四六章 班 治證同前

啊! 利散業治中熱在問 右為末研与每服三錢食後先用水漱口待心中熱黃丹奶細墨晚各 脈熱積胸中致多食數澳小便過於所飲亦有不渴 食為効不可多 iFi j 飲食目消為小 欲水便以令水調下 厚朴 积實各一大黃根四 便 者 ነቸጋ 能食小便亦黄城利至不欲

ここ日月 かな 参浦九 加味錢氏白木散 治消中消數善機 右為末煉蜜九每服二十九米飲下 每服五錢水煎食遠服 一酒 兩浸 **各** 彰蓝白茯苓去白花錢二枳殼生熟柴胡 治食你胃中結熟消穀善食不生肌肉 赤茯苓 菖蒲 **巡治** 华 輝 遠志 地骨皮 甘草灵 奎

清凉飲子 到近四月 白音 便數 水煎食遠服 右水二盏酒一小盏煎服 各五桃仁 杏仁松五當歸六紅花 许升麻梢知母酒甘草及己上酒生地黄 防風梢 防 羌 黄縣 龍膽草 活梢 治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結 柴胡 梢 石膏各一 卷二十 九 黄茂梢 甘草梢生黄芩 防己

J. Jo al Li Ala 燜 甘露膏 金 右為末水浸蒸餅九或捏劑作薄餅子晒乾碎如米 小便頻數又名蘭香飲子 扎 每用淡薑湯調下二錢 半夏 石膏或知母一 分 治 治熱中消渴止後補 蘭 消渴飲水極多善食而瘦自汗大便結燥 3 香 白豆蔻 英甘草生 经治率絕 精血益 連 五 分錢 翹 防風幾人參 諸虚解勞倦去 桔 梗 兲 升麻

銀段四個月音 沟 瘡瘍 骨 先 石器内水煮爛 銀 將 節 邱涂 木 揩 猪 石器内煮半 問熱寧心强志安神定眼固藏府進飲食免生 再用 肚淨 肚 五味子 77 黄連 洗 水 調 控 研 兩生薑 如 為膏入 日鴻出黃連洗去蜜酒今盡 乾復以懲椒酷輕等同藥以 泥 杜 搜 仲 研白塞各 猪肚内 和 下 項 絲蓋 以線縫定仍 樂 山樂 石 斛 剉 水 研| 酒

مله الم المدال لوال 天門冬丸 悶 飲送下一方有白术二兩陽起石一兩 千杵九如梧子大每服五十九食前用温酒或糯米 右為細末用猪肚膏搜和得所如膏少添熟蜜捣數 小便白濁 山茱萸去車前子 黄芪四兔絲子酒沒蒸沉香中麝香一錢别 當歸 治初得消中食己如飢手足煩熱背膊 兩二磁石 城白茯苓 双治年起 新蓮內法 鼈甲酯熟地 概角子が川考る 竞

軍步四月 白青 봠 送下食前 腎鄰花湯 右為細末煉蜜九如梧子大每服二十九用栗米飲 肉從蓉酒沒一鹿茸酒五味子天門冬出土瓜根乾瓜蔓根 新 猪腎一大豆 一齊花 雨半難力金点具桑螵蛸十枚牡蠣顺二 治 消 中日夜尿八九升者 石膏三两 人参 熟地黄 赤石脂 矢口 澤瀉 母 焙

1.10 m / halo 旋卷九 小冤終子九旦兩應其九見沒安野九見養花湯即 右攻咀用水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓 服 下樂者取三升分作三服渴急飲之下焦熟者夜輒 一劑渴止勿服 知母 葛根 经治學鄉 黄芩 磁石聚瓜姜根 7 甘

天王補心丹仍穿心保神益血固精此力强志令人不送下 對京四周百日 在高末煉蜜丸如梧桐子大母服五十九空心米飲放然炒巴戟酒龍骨 死絲子酒杜仲去皮判此太太 黄芪鱼湯澤瀉 鹿茸去毛切故然炒巴戟酒龍骨 死絲子酒杜仲去皮判董教育人 五味子 草蘚 破難各所子一個重六獎 上菜英 桂心 山藥 右

大三日年 人 右尚末煉蜜九每兩作十九金箔為衣每服一九燈 心氣 忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽氧口燥育養 心囊汤食後臨卧化下或作梧桐子大凡吞服亦可 當歸去益五味子去枝梗 熟地黄此人參其白茯苓去遠志去石菖蒲五元 洗甘草 及参門冬士百部洗 相子仁 19 桔梗去天門冬去酸東仁去丹冬 西治學此 杜仲 四班 茯神 7

雙補 腎 **濫** 散 ち 九空心囊湯送下 為細 九 鹿角膠二白茯苓去人參 39治腎虚水涸燥渴劳倦 治消腎腎氣虚損發渴小便數腰膝痛 末煉蜜為九 兩生扇一线 絲子與酒 焙蘆 酒 如桐子大硃砂為衣每服五 黄芪 焙凌 覆盆子 安是宣木瓜各一 盖意以仁此熟地黄 五味子 沉香

とこり 日本人 金銀箔九 煮腎至一盖去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半 分煎至五分去滓空心服晚食前再服 右對碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一蓋半 雞胜胜做遠志之人多 兩麥門冬出川芳和二五味子 府 磁石温法赤汁 桂心 治消腎口乾眼澀陰痿手足順疼小便多 **3**5 熟地黄 提治年經 白茯苓 桑螵蛸做黄芪 龍骨 炙甘草 元参 當歸各己 澤

白茯苓儿 銀ジ四月 右除别研藥外為細末再研勻煉蜜和丸如梧 大每服二十九加至三十九不拘時栗米飲送下 令腎枯燥遂致此疾兩 腿 乾酒 各浸 山藥 箔 一参門冬去 雨宿 治消腎因消中之後胃熱入 百 銀箔 F 五味子 半七刀 焙 雨心 黄連四白茯苓去生地黄始 半焙 細百 澤 研片 丹砂 瀉 澌 紅田 研瓜姜根 腰 脚無力 天門冬士肉從蓉 腎消燥 葛 桐子 腎 胎

一大三日三 在 龍鳳九 右為細末煉塞九如桐子大每服三十九食前米飲 右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大每服三 十凡食前煎磁石沸送下 白茯苓 鹿茸一兩兔絲子酒山縣各二 雞胜胜三十具 熟地黄 元参巴上各石斛长蛇林子各 覆盆子 姓治學蝇 黄連 瓜姜根 单解 野

参芪湯 金分之母 白草 加減八味丸 任下具龍九 煎一方有氧葛木瓜馬梅 右判每服四錢水一盏半煎八分日進四服留滓合 送下濃煎人參湯亦可一方用麪糊為九鹽酒鹽湯 白芍藥品二白茯苓 人麥 桔 治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能 梗 天花粉 北五味子內 甘草两各 綿黄茂鹽 4

七足四年 全各 任下三五十九午前晚問空腹再服此藥不惟 右各研末秤和匀煉蜜凡梧子大五更初温酒鹽 浉 亦 既濟心煩躁渴小便頻數白濁陰痿飲食不多肌膚 免生癰疽人服永除渴疾氣血加出 白茯苓去牡丹皮去澤寫酒湖縣五味子做 削或腿腫脚先瘦小 山茱萸肉焙 灼柱 不去 見麗 避此年得 大熟地黄素 地上 楽 3 止渴 半炒 湯

竹龍散三治消湯 五味子代附子此方沈存中載於靈苑方得可一日兩服少渴者只一服過止後宜八味右為末母服二錢不拘時冬瓜煎湯調服瓜五靈脂州生黑豆去水 神湯三治三消渴 進房 勘 疾 枇杷葉去甘草、括隻根 黄茂

考歸湯 四 大足四年 全書 甘草石膏湯治渴病全衛再劇古白滑微腫咽喉嚥唾 物湯 右為到散每服四錢水一蓋煎七分空心温服小便 右水煎服 不利加茯苓 芳三當歸五我 异 治失血煩熱作渴或頭痛眩暈 概治草 繩

忍冬地白鹭 甘草少許為末即以 每服五十九至百九酒飲任下一方用忍冬草煎服 お 刖 米用洗 監腫時渴飲冷白沫如膠 草 親酒於瓶 治 渴 载不 ーン2 名 多 疾愈 内 蜜少 須 浸 719 吸根 預 ノス 浸 花墓 防 酒煮糊 糠火煨一宿 一花 發 名葉 癰 飲冷乃止 為 集可 花用 如梧 取 一之 名一左名 出晒轧入 惊即 桐 子 機を 無渴 麻、潤 藤公

藍葉散 1.17 me 1.11 奇·華也此樂不特治雞亦能止渴并五寿諸漏 五種飛尸酒研傳瘡亦好但留一口泄毒氣真經 小肠通利此藥到得力用乾者不及生者効速仍治 此藤凌冬不凋三月開花五出黄白相間微香蒂帶 紅外科精要又以酒煮審服取時不犯鐵氣服至大 沉香 藍葉 治渴利口乾煩熱背生癰疽亦嫩疼痛 升麻 赤芍藥 Á 元参 班治 華 罐 犀角屑 麥門冬法黄茂 甘草止用各大黄二 翌 葛 根 劾

齊花九 **元参**散 野江四届全書 右為細 温 右吹咀每服四錢水一中盡煎至六分去滓不拘時 服 元参 杳 治渴 末每服二錢不拘時用温 木香 治 芒硝 强中為病並長興威不交精溢自出消渴 W. 杊 黄茂本一 煩熱生癰疽 大黄炒版 甘草 犀角屑 焮 残生 腫 水調 半用上 疼痛 羚羊角屑 下 沉

紫蘇湯 人二日屋 人島 右為細末用猪腎一 九空心鹽湯下 子大如難凡入少酒糊九或煉蜜丸亦可每服七十 2)後多作癰疽皆由過服丹石所 瓜姜根 奉龙 14g 熟地黄酒蒸 治消渴後遍身浮腫心膈不利 大豆去茯神去磁石版 Á 地骨皮太鹿耳) 具如食法爛煮杵和凡如梧 设治學經 一沉香水見人 致 細元参 星 石斛 桐

瞿麥湯 翻页四月 石香 不利 滓 右攻咀每服四錢水一盏半生薑半分煎至八分去 瞿麥穗 紫蘇茎葉 不拘時温 杳 兩羚羊角够檳榔路七桂心去枳殼数獨活 治消渴飲成水氣面目并足膝腔浮腫小便 澤瀉 服 桑白皮 滑石各半防己七 美黄芩 赤茯苓西 郁李仁步

夢歷九 服良人再股 右吹咀母服三錢用水一盏煎至七分去滓空心温 十九食前赤挨苓煎湯下日三四 右為細末煉塞和搖一二百杆丸如 甜草 錢半桑螵蛸炒 庭肠紅盛仁 杏仁湯 治消渴後成水病浮 極六千号 枚十 腫 腋 仁陵 桐 者去 子大母服三 魅皮 61.7 炒火 黄及 防

五皮飲溶 成為消中善食而瘦或燥鬱甚而消渴多飲而數小補遺人多白木湯無門治胸局雄熟煩滿不欲食或輝 損虚肝心相博風熱燥其三焦腸胃燥熱佛鬱而水 便或熱病或忍酒色誤服熱樂者致脾胃真陰血液 止而便注為小便多也权世俗流 渴難多飲而水液終不能浸潤 不能宣行則 濟生野氣九俱見中消分消湯九見 周身不得潤澤故瘦奉黃黑而燥熱 於腸 不明乎此妄為下 胃之外渴不 脹

麥痺并傷寒雜病 微县者也此樂魚療一切陽實陰虚風熱燥鬱 所傳三消病也雖 搜為消中 能 疽瘡瘍上為喘嗽下為痿瘅或停積而 焦虚冷誤死多矣又如周身風熱燥鬱或為目瘴癰 昏眩風中偏枯 傅化者變水腫腹脹也凡多飲數洩為渴多食數 肌肉 消瘦小便有脂液者為消腎此世之 酒過積毒一切腸胃澀滯壅塞瘡亦 經所不載以內經考之但燥熟 煩 渴氣液不得宣通並宜 濕熟內甚不 服 之 頭 目 ح

人足以軍全書

路名中華

府疏利亦不妨取劾更妙後却常服之或魚服消痞計入塞少許温服漸加至兩許無時日三服或得藏右為粗末每服五錢水一蓋薑三片同煎至半蓋絞消石 芒硝化半 金がいた とう 九若覺勝胃結滯或濕熟內甚自利者去大黃芒硝 桂 木香 養香祭上寒水石而甘草而石膏四澤寫各半連翹 括藝根 乾葛 茯苓的一官 人参 白术 當歸 芍藥 大黄 山梔子

大三日車 白島 生地黃飲子簡治消渴咽乾面亦煩躁 右 利 渴 服 對散母服三錢水一盖煎至六分去滓食後臨澤瀉 甘草矣各 肺 佐以澤瀉 此方乃全用二黄九甘露飲料生精補血潤 麥門冬俱士积殼去 經潤澤則大腑 虚生乾地黄光 积殼球導二腑使心火下行則 流畅宿熟既 熟乾地黄洗 炒瓢 石斛去根 消其渴自止造 黄耆蜜天門冬 枇杷葉 11-腑 媬 清 日.

梅蘇凡 黄茂湯 多方四百百十 水二種煎至一種食遠服水二種煎至一 泉甘草各一 精深妙無踰此 白梅肉 黄民 家茯苓士皮瓜蔓根 百樂煎三可梨勒吳用人 治消渴 治諸渴疾 紫蘇葉 膈 热烦躁生津 烏 梅肉 参及平甘草雨 麥門冬世生地黄 兩麥門冬去心七 液

大記习事人的 殺 口 蟲方 燥咽乾本事黄芪湯 至一 苦棟根取新白皮一握切焙入麝香少許水二椀煎 液 不拘時含化嚥津行路解湯 右為細末煉黄蠟汁和為九如雞頭實大母服一九 **姚蟲而色紅其渴順止乃知消渴** 堅出 **校空心飲之雖困頓不妨自後下蟲三四條** 志夷 治消渴有蟲 **抵治準** 治心中煩躁不生津液不思 一盜有蟲耗其津 類

多りせん るる 麥香散和治心氣不寧諸虚百損肢體沉重情思不樂 參术飲即參答白术散 見 飲食 渴欲飲水飲食減少肌肉瘦疼漸成勞瘵常服補 右吹咀每服五錢薑棗烏梅煎去滓食後服 夜多異夢盜汗失精恐怖 黄芪 啊 甘草 熟地黄 人麥 天門冬路五白茯苓 白芍縣 下 泽 煩悸喜怒無時口乾 五味子 麥門冬谷 咽燥 精

七三四年 在上 兙 四 葛湯 君子湯見止紹脾飲見中七珍散見不大補湯 右為判散每服四錢水一大益生薑三片東一枚煎 七分去海空心服一方有炮附子半雨 血調心氣進飲食安神守中功効不可具述 南木香 檀香及二沉香兵馬縣 縮砂仁 橘紅 多 山樂 黄茂蟹白茯苓去石蓮肉去白木 檀香路二沉香氏甘草七英 张治年 罐 乾薑地各丁香 £ 勞見

Ę 望江山月 台は 梅木瓜湯 版 枯燥血泣小便併多肌肉骤專嗜冷物寒漿 葛根五枳實墊切施子仁 豆豉 右對散每服四錢水一盏半薑五片煎七分不拘 葛根二枳實 木瓜乾 馬梅枝破不麥藥炒甘草 治 飲酒多發積為酷熱熏蒸五臟津液 豆豉 服 草果 甘草

人三日華 在馬 三神 枳 棋子九 不 ゟ 右為未麪糊九如桐子大每服三十九空心鹽湯 對散母服四錢水二益糯木根一程煎七分去加黃連五春秋冬不用 拍 烏 湯 枳 貯 梅肉 棋子~麝香 治證同 温 服 治 春秋冬不用 岩 謹同前 無 前 糯 木根白茅根亦可如無白茅根 右草鄉 炒草 各水 一点 两過 刖 枳實去熟 滓 夏

牛黄丸 毒, 多许山屋 白草 防椒塵黄丸 右為細末研勻煉塞扣丸如彈子大母服一九食後 未稈繩亦可 并 那 鄉 麝香 山 柜仁 吳甘草和一 治心脾壅熱口古乾燥及煩渴 治腹滿口乾舌燥此腸間有水氣也是 两炒各 馬牙硝州考剪 麥門冬士 黄 硃

甘露九 瓜 しこりも 宴根 散 右為細末研勻母服二錢竹葉鴻調服無時大黃剉炒各牛黄研滑石所各二 八菱根 胡黄連 黄芩各七白殭鳖炒白鲜 竹葉煎湯化下 脳 寒 水 解 石 聖毒退風熱治口 古乾燥 治 風熱口中乾燥舌裂成瘡 宿晚 出 令 失亦 毒攤 经治學與 北馬牙硝 研啊 甘草水 秀 龍

含化丸 致定四库 全書 茂芍桂苦酒湯 石以水四大盛煎取一大盛半綿濾過入蜜同煎令石膏細研水寒水石細白蜜各半 稠 食後用新 右為細末研与以糯米飯和凡如彈子大每服半 凡 黄疸 如雞頭實大常含一九兴津 治 上焦煩 汲水磨化 匮金 熟口舌乾燥心神不清 腶 半1 頭目 不 利

シニコ巨 公島 桂 枝 阻故也 腹蒲欲嘔吐懊懷而不和者宜吐之不宜汗 升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒 右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升温服 加黄茂湯重治黃疸脈浮而服中和者宜汗之若 桂 黄茂四白芍藥 枝 枚 白芍藥 Ų. 桂枝谷 **挑治华**絕 生薑和二黄花 甘草和 圭

弘治口是 大黄硝石湯金 黄芪湯半治黄汗身體腫發熱不渴汗出染衣黄色 粥一升餘以助樂力取微汗若不汗更服 右六味以水八升煮取三升温服一升须臾飲熱稀 前服一方入竹葉十四片不用薑一方無甘草 右㕮咀每服四錢水一盡生薑五片煎七分去滓食 黄 也淡豆豉和一甘草或半 ムせ 民士蘆水方藥 茵蔯蒿各二石膏四麥門冬

三大正日華在 茵藤五苓散 茵陳五苓散用茵陳末十分五苓散五分二物和先食 小半夏湯見四 升頻服 飲方寸ヒ日二服 便黑赤煩渴發熱不得安寧此益汗下太早服藥不 右四味以水六升煮取二升去滓内硝石更煮取 大黄 黄蘖 治傷寒温濕熱病感胃後發為黃疸小 硝石各四 理太平輝 栀子女 圭

加減五苓散 治之甚効 溶食前服溶再煎連進數服小便清利為愈 右用生料五苓散一两加入茵蔯半兩車前子一錢 對證因感濕熱病以致遍身發黄當用茵陳五苓散 和与分二版每服水一碗燈草五十茎同煎八分去 **木通崇胡各一錢半酒後得證加乾葛二錢并前藥** 治飲食伏暑鬱發為疸順渴引飲小 F J.10 L 茵陳湯血治寒熱不食食即頭脏心胸不安人人發黄 升去 率分温三服小便當利尿如早 角汁狀色正赤 右三味以水一斗先煮茵藤減六升內三味煮取三 名為穀疸 水二鍾煎 宿腹戒黄從小便去也 茵蔯蒿が栀子十四大黄 茵藤 1.1 猪苓女白术 鍾不拘時服一方有桂心 医台車 赤茯苓 主

一般追九海 多方四年日本 茯苓茵蘇梔子湯實完顏正即丙寅二月間因官事勢 股亦可方見 肝心下痞滿四肢困倦身體麻木大傅身目俱黃微 役飲食不節心火乘脾脾氣虚弱又以悉怒氣逆傷 右為細末用牛膽汁入少煉蜜和九如桐子大每服 五十九空心熱水或生薑甘草煎湯送下魚紅九子 苦参与龍膽草一牛膽一枚

てこりま 緩為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黄瘀熱已行 熟日暮則止至四月尤或其子以危急求請治之具 見青色頻黑心神順亂怔忡不安兀兀欲吐口生惡 説其事診其脈浮而緩金匱要略云寸口脈浮為風 沫飲食運化時下完穀小便癃閉而亦黑辰已間 苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流筋脫身體 陽脈緊為傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃 盡黄名曰穀疸此方主之 经治草地 <u>수</u> 中 綮 趺

好定四月 右作一服用長流水三般煎至一般去渣温服食前 以甘苦又濕化于火熱反勝之治以苦寒以苦泄之 以淡渗之以栀子茵蔯苦寒能瀉濕熱而退其黄故 以為君難經云并主心下滿以黃連积實苦寒泄心 茵陳葉一茯苓五次栀子仁 服減半二服良愈內經云熱淫于內治以鹹寒佐 漢防己分二青皮士白 黄芩生六黄連其积殼 粉猪苓去澤寫 養术士皮白木 陳皮

とこの単 台島 梔子大黄湯 四 热利小便而去癃閉 除胃中濕熱泄其壅滯養其正氣漢防已苦寒能去 寒瀉火補氣故以為臣二术苦甘温青皮苦辛温能 十二經留濕澤瀉鹹平茯苓猪苓甘平導肠脱中 下痞滴肺主氣今熱傷其氣故身體麻木以黄芩苦 味以水六升煎取二升分温三服 山栀 大黄 治酒疸心中懊懷或熱痛 推治學経 松實五豆豉 يالد 麦

一多りせん 霍批飲 葛根湯年治酒疸 葛花解酲湯 水 水煎下酒煮黄連九 茯苓 乾葛二桅子仁 霍香葉 氏戴 鍾煎至七分不拘 17 雞 做見 距子 傷 杹 把葉去桑白皮 11 柴胡湯 等 枳實 時温 姓士 寒見 服 热往 炒瓢 豆豉錢 來 陳 皮 戟 葛

五苓散見消 藿香醒脾 **电引用在局** 當歸白术湯 水二鍾薑三片煎至一鍾食後水二鍾萬人北皮米枳實处前胡各 厚 當 歸 朴 **灌** 注 飲 四三 黄 岑 张一陳皮士白 提及董甘草灵半夏生生 茵蔯 歌らなり 用微 薑 熱 汁 湯 浸泡 宿作 以四

到力に在 当言 白木湯且治酒道因下後變為黑疸目青面黑心中 酒煮黄連丸 治酒疸 啖蒜產狀大便黑皮膚不仁其脈微而 服日進二三服 每服二錢水一 盖蓝三片囊一枚煎七分不拘時 水一鍾煎至七分食前 甘草尺谷 白木 桂心各一积實數豆豉 服 乾葛 数 杏仁 熱

IN COLD IN ALLE 硝石散 加味四君子湯 水二種生薑五片紅棗二枚煎一種 右二味為末以大麥粥汁和服方寸七日三服病隨 大小便去小便正黄大便正黑是其候也 且此各甘草民 硝石 **鱼** 金 攀石各等 白术 治色疸 壓台單鍵 白茯苓 白芍藥 黄芪炎白扁 服 無 時

滑石散 一起 江西庫全世 腎疸湯 升麻根平蒼木或防風根 獨活根 白野疸湯東治野疸自黄潭身金色小便赤型出黄水為度粉相近未知熟是兩存之 右為細未每服二銭用大麥粥清食前調服以小滑石一兩白攀一兩 滑石一两白蓉 胡 瀉 治女勞 甘草根分三 疸 為防風 糕: 黄蘖分人参 神親分六 成 中白茯苓 指苓 白术 便

大三日車 白華 胃苓飲即平胃散五苓散併用見中 從冷寒濕湯蜜治黄疸寒熱嘔吐渴欲飲水身體面 小兔絲子丸 俱黄小便不利全不食不得卧 分作二貼水煎食前稍熱服 葛根各四 茵藤少白茯苓六木猪苓 澤瀉 苍术米泔没黄連分五山梔炒秦艽 Ų 治女勞疸見赤 致治草鄉 牵食 白术 至 防己 陳皮 目

多分正月 ろま 當歸秦尤散 麥术健 脾湯 丘谷 水二鍾棗二枚煎八分食前服色疸加黄芪炒白扁 水二鍾煎七分食前服 白术 當歸 人参 一残各民甘草水 茯苓 白术五谷 治五疸口淡咽乾倦怠發熱微寒 治發黄日外脾胃虚弱飲食少思 秦艽 分 英白茯苓 當歸 陳皮 川芳 芍藥 白芍樂 熟

マニョ きんま 百 瓜蒂散見傷 麻黄醉酒湯金治黄疸 養柴湯 用麻黄三兩以好清酒五升煮取二升五合頓服盡 冬月用酒煮春月用水煮 水二麵薑三片煎八分食前服海生有肉柱 治疸取藜蘆置灰內炮之少變色搗為末水服半 地黄酒陳皮谷 四君子湯 半夏麹 极治华战 八味九俱見 虚勞 灵甘草分五 至

· 鼻瓜蒂散 雖治黃疸渾身如金色 黃連散蟹治黃疸大小便秘澀壅熱累効 多次四月日書 右為極細木食後温水調下二錢日三服先用瓜蒂 右為細末母夜臨卧時先含水一口却於兩鼻孔窗 散搖鼻取下黄水却服此樂 錢七小便不利數服 瓜带气母丁香或泰米四十赤小 黃連一大黄醋拌炒黄芩 甘草广两 豆

L'UD M / LE 茵蔯附子乾薑湯蟹至元丙寅六月時雨霖聖人多病 感用通聖散二服後添身體困甚方命醫治之醫以 濕疫真定韓君祥因勞役過度渴飲涼茶又食冷物 退病頭痛肢節亦疼身體沉重胸滿不食自以為外 又六日以三乙承氣湯下之躁渴尤甚又投白虎加 百解散發其汗越四日以小柴胡湯二服後加煩熱 五日効重者半月効 上半字便睡至明月取下黄水便服黄連散病輕者 西北京西

對次四月 不欲開 肢 人來湯柴胡飲之類病愈增又易醫用黃連解毒湯 度 硃砂膏至寳丹十七日後病勢轉增傳變身目俱黄 所不勝乘所勝也時值霖雨乃寒濕相合此謂陰證 及本位此證得之国時熱而多飲冷加以寒凉藥過 不了命予治之形其脈緊細按之虚空兩寸脈短不 體沉重皆惡寒皮膚冷心下痞硬按之則痛 助水乘心反來侮土先囚其母後薄其子經云薄 全書 目睛不了了懶言語自汗小便利大便了

I KILD DE CIAL 寒濕而退其黄故為佐使也煎服一 店滿 茵陳微苦寒其氣輕浮佐以薑附能去 庸 奏問 草蔻辛熱白术陳皮苦甘温健脾燥濕故以為臣生 燥之附子乾薑辛甘大熟散其中寒故以為君半夏 服悉去又服理中數服氣得平復 董辛温以散之澤瀉甘平以渗之枳實苦微寒寫其 甘熱佐以苦辛濕淫所勝平以苦熱以淡滲之以苦 無治學編 劑前證減半兩 ī

發黃以茵藤附子乾薑湯主之經云寒淫於內治以

多少正母石書 治陰黄汗染衣涕唾黄 右用蔓菁子捣末平旦以井花水服一匙日再加至 右生薑五片水煎去滓涼服 色漸退白則瘥不過服五升而愈 雨匙以知為度每夜小便中浸少許帛子各書記日 枳實好半夏 翠寫各半白茯苓 去皮乾薑地一的陳一 二分草豆蔻粮 橘紅

袝 中湯東治面黃多汗目皆亦四肢沉重減食腹中時 痛咳嗽雨手左脈短右脈弦細燕澀右手關脈虚 右吹咀每服四錢七以牛乳汁一盡煎至六分去滓 不 升麻 拘時温服 秦光士苗土旋覆花 /. 11m しなる 松炙甘草分黄茂二头神麴三红花少 柴胡各二當歸身小蒼术小澤寫如五味 đ) Ī 治陰黃不欲聞人言小便不利 題治 準 縄 赤茯苓去足甘草料 至

1)-·飲沒四庫全書 梔子櫱皮湯 大茵蔯湯 建中湯堤 水四升煮取一升半去滓分温再服 右作二服水煎食前 栀子十五甘草一黄葉二 茵陳萬平大黄 見肥梔子 中枚 勞大建中湯見惡理中湯見霍 治黄疸及頭汗出發黄 ŢŦ. 治傷寒及濕家發黄

大臣日華人生 山茵陳散 治疸證發熱大小便秘澀 茵蔯梔子黃連三物湯 便出也 去滓分三服小便利出如阜角汁一宿腹减黄從小 水二盏煎八分去滓服 水三升三合半先煮茵藤蛾一半为二味煮取 茵蔯蒿三栀子 山茵藤 1 絕子發二赤茯苓 黄連卷二 班治华蝇 治大便自利而黄 枳實各一夢產 窐

重歩に居 1), 清飲 温中凡 右作 全大補湯見 水二種薑三片紅東一杖煎 斤以醋炒為末入糯米炒極黄為末亦用一斤 甘草 柴胡或赤茯苓或桑白皮 服 治疸證葵熟諸熱通用 溪丹 治黄 水二鐘薑三片煎一鍾食前 虚 胖 食宜 無草 積野 但貧 補賤 鹶 一鍾食前 11 隂人 萝 燥服 銭各 温益 半甘草 服 而其 服 已飲 醋 銭炙 ひり 糊

大艺习事公事 大温中九丹治黄胖 飲下五六十九面肥白與氣虚羸弱者白木湯下三 右為細末醋糊丸如桐子大面黑筋骨露氣實者米 重者不過七兩愈 青皮六白术 如桐子大每米飲下四五十九是口輕者服五兩 秋冬一兩厚朴黑五兩陳皮西山查西蒼术五兩春夏二兩厚朴薑製炒陳皮三山查西蒼代五兩香附一宿秋冬三宿 甘草而針砂沙三、苦麥 茯苓和三 年朱先生 路治學題 晚 充

媛 金げにん 中九 起 右為末醋糊九空心鹽薑湯下五十九晚食煎酒 化之物服過七日後便覺手掌心涼口唇內有紅暈 四十九是一切生冷油臟竊舊羊鴨生硬併 亦可忌狗肉 調理半月愈 陳 香附一甘草一新砂山两 皮 イコマー 治黄胖殺肝 蒼木 厚朴製三稜 **那舒脾氣虚者不宜用** 淬炒 白术 青皮各五 糍 粽 下 難

大足四車 白野 叉方 東攀九雖治食勞黄目黃身黃 食前 白礬 右為末生薑汁丸每服二三十九一日二次米飲下 右為末東向九母服二三十九食後薑湯下一方用早礬亦用米醋點之燒用木炭 皂礬五兩東內二蒸粉五 用必 1 **遊治率** 芜

銀牙四月 白書 青龍散明治風氣傳化腹內疼結而目黃風氣不得泄 膽裝九本治男婦食勞食氣面黃虛腫症癖氣塊 時辰如膏好入蠟茶二兩同和為丸桐子大每服 慢火熬半日取出棗子去核次下蠟再慢火熬一 右以砂鍋或石器內用 下日三服一月見 九茶清下日三服食後如人年勝風痔疾陳 膽 整 三 及 五 者 黄蠟二青州大東五十 劾 頭醋三升先下 膽礬共東子 术 飲

大己司奉 公馬 三聖儿 治嘈雜神効 右為未每日三股食後沸湯調下一錢大水川沒一宿 水川沒一宿 水川沒一宿 為熱中煩渴引 白术兩橘紅一黄連 嘈雜 飲 经治學解 **銭炒** 五 虚 半荆芥穗一何首為出 丰

面牙四星 白電 證治準繩卷二十九 津唾下或薑湯下 右為細末神翹糊九如菜豆大每服七八十九食遠 治水飲 神翹糊儿服 白茯苓 兩黃連或為术兩獨活此